

2022年4月改訂

貯法 室温保存

## 動物用医薬品

### フルオロキノロン系抗菌剤

要指示医薬品 指定医薬品

# 動物用ウェルメイト®錠 15 動物用ウェルメイト®錠 50 動物用ウェルメイト®錠 100

動物用ウェルメイト錠は、フルオロキノロン系抗菌薬のオフロキサシンを有効成分とする犬、猫用の錠剤です。オフロキサシンはグラム陽性菌及びグラム陰性菌に対して広範囲な抗菌スペクトラムを有し、殺菌的に作用します。また、オフロキサシンは生体内で代謝を受け難く、良好な腸管吸収性を有することから、経口投与後、速やかに高い血中濃度が得られ、各組織・臓器へ高濃度に移行します。

#### 【成分及び分量】

品名	動物用ウェルメイト錠 15
有効成分	日本薬局方 オフロキサシン
含量	1錠中 15 mg

品名	動物用ウェルメイト錠 50
有効成分	日本薬局方 オフロキサシン
含量	1錠中 50 mg

品名	動物用ウェルメイト錠 100
有効成分	日本薬局方 オフロキサシン
含量	1錠中 100 mg

#### 【効能又は効果】

有効菌種：本剤に感受性の次の菌種

ブドウ球菌属、大腸菌

適応症：犬：細菌性尿路感染症、

細菌性皮膚感染症

猫：細菌性尿路感染症

#### 【用法及び用量】

体重 1 kg 当たりオフロキサシンとして 1 日量 5～10 mg を 5～7 日間経口投与する。

#### 【使用上の注意】

「基本的事項」

##### 1 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- ・本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であってもそれを反復する投与は避けること。

承認指令書番号	18 消安第 5601 号 (動物用ウェルメイト錠 15)
	29 動薬第 273 号 (動物用ウェルメイト錠 50)
	29 動薬第 274 号 (動物用ウェルメイト錠 100)
販売開始年月	平成 18 年 10 月 (動物用ウェルメイト錠 15)
	平成 18 年 8 月 (動物用ウェルメイト錠 50)
	平成 18 年 7 月 (動物用ウェルメイト錠 100)
再審査結果公表年月	平成 26 年 5 月

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

##### 2 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

(犬及び猫に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

「専門的事項」

##### ①対象動物の使用制限等

- ・類似化合物で過敏症の認められた犬・猫に投与する場合は、使用の是非を慎重に判断すること。
- ・本剤の大量投与により幼若犬及び幼若猫で関節障害が認められたため、12 ヶ月齢未満の犬及び猫には使用しないこと。

##### ②重要な基本的注意

- ・本剤は第一次選択薬が無効である症例に限り使用すること。
- ・本剤の使用に当たっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の投与に止めること。
- ・犬の皮膚感染症には様々な原因があることから、本剤の投与に当たっては、病気の状態をよく観察して使用の是非を慎重に判断すること。

##### ③相互作用

- ・人で、テオフィリンとの併用により、テオフィリンの血中濃度を上昇させるとの報告があるので、併用する場合にはテオフィリンを減量するなど慎重に投与すること。
- ・人で、マグネシウム又はアルミニウム含有の制酸剤との併用により、吸収が低下し、効果が減弱すると報告があるので、併用は避けることが望ましい。
- ・人で、非ステロイド性消炎鎮痛剤との併用により、まれに痙攣が発現すると報告がある。

#### ④副作用

・本剤を投与すると、ときに一過性の便秘、嘔吐が犬で見られ、またときに嘔吐、可視粘膜紅潮、元気低下が猫で見られることがある。

#### ⑤その他の注意

・ラットに対し体重1 kgあたり1日36mg以上を15日間連続で経口投与した場合、精子数とその運動性が顕著に低下したとの報告がある。

### 【薬理学的情報等】

#### (薬物動態)

・犬(10mg/kg、経口)

最高到達血中濃度(C<sub>max</sub>) 7.6 μg/mL

最高濃度到達時間(T<sub>max</sub>) 1.1時間

血漿半減期(T<sub>1/2</sub>) 6.7時間

・猫(10mg/kg、経口)

最高到達血中濃度(C<sub>max</sub>) 6.4 μg/mL

最高濃度到達時間(T<sub>max</sub>) 2.2時間

血漿半減期(T<sub>1/2</sub>) 7.1時間

#### (薬効薬理)

*Staphylococcus* sp. (犬・猫、尿路由来) :

MIC<sub>90</sub> 0.2 μg/mL

*Escherichia coli* (犬・猫、尿路由来) :

MIC<sub>90</sub> 0.1 μg/mL

### 【包装】

動物用ウエルメイト錠15 100錠

動物用ウエルメイト錠50 100錠

動物用ウエルメイト錠100 50錠

### 【製品情報お問い合わせ先】

明治アニマルヘルス株式会社 営業部

〒860-0083 熊本市北区大窪一丁目6番1号

TEL : 096 (345) 6505 FAX : 096 (345) 7879

<https://www.vet.meiji.com/>

製造販売元

**明治アニマルヘルス株式会社**

東京都中央区京橋 2 - 4 - 16

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。