

使用説明書

※使用前には必ず本説明書を読み、注意事項を守って使用してください。

2022年2月作成（初版）

指定

貯法	遮光して、10℃以下
有効期間	製造後3年1か月間

動物用医薬品

承認指令書番号 3 動薬第2430号

動物用生物学的製剤

生物由来製品 劇薬 要指示医薬品 指定医薬品

アビテクト®ND

（一般的名称：ニューカッスル病生ワクチン（シード））

【本質の説明又は製造方法】

本剤は、ニューカッスル病ウイルスMET95株を接種した発育鶏卵の感染尿膜腔液を凍結乾燥した生ワクチンである。

乾燥ワクチンは淡黄灰白色の乾燥物で、生理食塩液を用いて溶解すると、帯褐淡黄色の透明な液体となる。

本剤は製造工程で発育鶏卵を使用している。

【成分及び分量】

乾燥ワクチン 1バイアル（5,000羽分）中

成分	分量
主剤	発育鶏卵培養ニューカッスル病ウイルスMET95株（シード） 5 × 10 ^{7.5} EID ₅₀ 以上
安定剤	乳糖水和物 ペプトン D-ソルビトール L-アルギニン塩酸塩 ゼラチン 100 mg 125 mg 50 mg 25 mg 6.25 mg
緩衝剤	リン酸緩衝食塩液 残量

※小分容器1,000羽分については、上記分量の1/5量となる。

※乳糖水和物は牛の乳由来成分、ペプトンは牛の乳及び豚の脾臓由来成分、ゼラチンは豚の皮膚由来成分を含む。

【効能又は効果】

鶏のニューカッスル病の予防

【用法及び用量】

乾燥ワクチンを日齢に応じた量の飲用水に溶かして、飲水投与する。

【使用上の注意】

（基本的事項）

1. 守らなければならないこと

（一般的注意）

- ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- ・本剤は効能又は効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法及び用量を厳守すること。

（使用者に対する注意）

- ・事故防止のため、作業時には防護メガネ、マスク、手袋等を着用すること。
- ・作業後は、石けん等で手をよく洗うこと。

（鶏に関する注意）

- ・鶏が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質等を考慮し、投与の適否の判断を慎重に行うこと。
 - ・元気・食欲不振、発熱、異常呼吸音、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。
 - ・疾病の治療を継続中のもの又は治療後間がないもの。
 - ・明らかな栄養障害があるもの。
 - ・他のワクチン投与や移動などによりストレスを受けているもの。
- ・ワクチン投与前後24時間は、対象鶏への投薬や消毒剤の使用を避けること。

（取扱い及び廃棄のための注意）

- ・外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。
- ・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
- ・本剤には他の薬剤（ワクチン）を加えて使用しないこと。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・直射日光、加温又は凍結は、本剤の品質に影響を与えるので避けること。
- ・使い残りのワクチン及び使用済みの容器は、消毒又は滅菌後に地方公共団体条例等に従い処分、若しくは感染性廃棄物として処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

（使用者に対する注意）

- ・本剤に含有されるニューカッスル病ウイルスは人獣共通感染症の病原体である。人の眼や鼻にワクチンウイルスが入ると結膜炎などの原因になるので、使用時には十分注意すること。
- ・誤ってワクチンが眼、鼻、口等に入った場合は直ちに洗浄水で洗い、必要があれば本使用説明書を持参し、医師の診察を受けること。また、作業後、眼に異常を感じた場合にも医師の診察を受けること。

本ワクチン成分の特徴

微生物名	抗原		アジュバント	
	人獣共通感染症の当否	微生物の生死	有無	種類
ニューカッスル病ウイルス	当	生	無	－

- ・乾燥ワクチン瓶内は、真空になっており破裂をすることがあるので、強い衝撃を与えないこと。
- ・開封時にアルミキャップの切断面で手指を切るおそれがあるので注意すること。

(鶏に関する注意)

- ・本剤の投与後は温度管理等に十分注意し、鶏に与えるストレスの軽減を図ること。
- ・副反応が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

(取扱い上の注意)

- ・本剤の調製時には、清潔な用具を使用し、投与方法に定められた方法に準じて均一なワクチン溶液とし、雑菌などを混入させないこと。
- ・溶解は使用直前に行い、溶解後は速やかに使用すること。使い残りのワクチンは雑菌の混入や効力低下のおそれがあるので、使用しないこと。
- ・よく振り混ぜて均一とし、使用すること。
- ・投与対象鶏群には、全部の鶏に均等に投与すること。
- ・本剤の投与方法は飲水投与方法であるので、本投与方法の注意事項を守って正しく使用すること。

飲水投与方法の注意事項

- ①鶏群の全部の鶏が均等に飲めるように、十分な数の給水器等を準備すること。
- ②飲水投与に用いる器具は、消毒薬を含まないきれいな冷水で洗浄すること。
- ③ワクチン投与前後24時間及びワクチン投与のための飲用水には、塩素剤又は飲水消毒剤等ワクチンウイルスに害のある薬剤の混入は絶対避けること。
- ④飲用水は、清水、井戸水などを用いること。やむを得ず水道水を使用する場合には、煮沸、汲み置き（一夜放置）、チオ硫酸ナトリウム（ハイポ）0.01～0.02%又はスキムミルク0.1～0.2%等を添加することにより残留塩素を除去した後、使用すること。
- ⑤投与前の2～3時間は断水すること。
- ⑥乾燥ワクチンに飲用水を加えて溶解し、飲水投与すること。ワクチン溶液は、下表を目安に1～2時間で飲み終えるように調製すること。
(1,000羽分：日齢・季節に応じて加減する)

	4日齢	4週齢	4か月齢以上
採卵鶏	3～5 L	20～30 L	60～80 L
肉用鶏	20 L	140 L	—

- ⑦給水器等に直射日光が当たらないように注意すること。

(専門的事項)

①警告

本剤の投与前には健康状態について確認し、重大な異常（重篤な疾病）を認めた場合は投与しないこと。

②相互作用

- ・本剤と鶏伝染性気管支炎生ワクチン又は鶏伝染性喉頭気管支炎ワクチンを同時投与すると、ウイルス間の干渉作用によりワクチン効果が抑制されることがあるので、1週間以上の間隔をあけること。
- ・移行抗体価の高い個体では、ワクチン効果が抑制されることがあるので、幼若な鶏群への投与は、移行抗体が消失する時期を考慮すること。

③副反応

鶏の健康状態によっては、本剤投与後に呼吸器症状などが認められる場合がある。

【薬理学的情報等】

(臨床成績)

2県下2施設の肉用鶏及び採卵鶏を供試し、臨床試験を実施した。その結果、3週齢の鶏に投与した場合、いずれの施設においてもニューカッスル病（ND）に対する予防効果が抗体応答より確認され、また安全であることが確認された。

(薬効薬理)

本剤又は既承認の単味生ワクチンを2週齢のSPF鶏群由来の鶏に投与したとき、NDに対する抗体価は投与後2週目に最大値となり、投与後8週目まで単味生ワクチン投与群と同等以上の抗体価を示した。

【包装】

1,000羽分
5,000羽分

【製品情報お問い合わせ先】

明治アニマルヘルス株式会社 営業部
〒860-0083 熊本市北区大窪一丁目6番1号
TEL：096(345)6505 FAX：096(345)7879

販売元 **明治アニマルヘルス株式会社**
熊本市北区大窪一丁目6番1号

製造販売元 **KMバイオロジクス株式会社**
熊本市北区大窪一丁目6番1号

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。